



Medellín, Marzo 16 de 2020

Dirigido a: Pacientes y familiares de pacientes con Inmunodeficiencias primarias

Asunto: Recomendaciones internacionales sobre los riesgos de la infección con COVID19 de pacientes y familiares

Estas son las medidas de prevención para la infección por COVID19:

- 1- Aislamiento en casa para el paciente con IDP a partir de la fecha y hasta nueva orden por parte del médico tratante.
- 2- Aislamiento en casa de los convivientes del paciente. En lo posible, concertar con sus empleadores la posibilidad de modalidades de teletrabajo desde la casa.
- 3- Lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, gel antibacterial, o alcohol antiséptico al 70% durante mínimo 30 a 40 segundos. Equivalente a lo que dura la canción de cumpleaños.
- 4- Evitar tocarse la cara con las manos, especialmente después del contacto con otra persona o superficies potencialmente contaminadas.
- 5- Limpiar con alcohol isopropílico al 70% o desinfectar con solución de hipoclorito de sodio (un pocillo de hipoclorito de sodio por 1 litro de agua) las áreas de contacto frecuente. Los equipos electrónicos como el celular, ipads y teclado de computador, deben ser consultadas en los manuales de estos. La mayoría de los fabricantes de estos equipos recomiendan emplear los paños que vienen con los equipos, aplicando alcohol isopropílico al paño suave y sin pelusa y luego limpiar suavemente sin hacer demasiada presión para no dañar el equipo. NO se debe aplicar directamente el alcohol sobre el equipo. SE recomienda verificar esta información con el fabricante.
- 6- No debe salir de casa, salvo por casos excepcionales y evitar el contacto físico con otras personas (saludos de beso, abrazo, etc).
- 7- No emplear medios de transporte masivo para desplazarse. Si es necesario hacerlo, llevar siempre consigo alcohol o gel antibacterial para aplicarlo en las manos al tocar superficies fuera de su casa.
- 8- Al llegar a casa lavarse las manos, lavar la ropa que trae puesta, nuevamente lavarse las manos y desinfectar los objetos personales; de ser posible, bañarse.



Cualquier inquietud adicional o en caso de tener síntomas llamar a las líneas habilitadas por los servicios de salud de la ciudad.

- Medellín línea de emergencias 123
- *774 desde el celular
- WhatsApp: 3003050295 (Número oficial de la secretaría de salud)
- Línea celular: 3218533928 (Número oficial de la secretaría de salud)
- Aplicación: CoronApp

Para los pacientes que requieren terapia de reemplazo con inmunoglobulina intravenosa:

- Antes de salir a la cita, traiga consigo gel antibacterial o alcohol.
- Utilizar mascarilla para el paciente.
- No utilice transporte público masivo.
- No toque superficies con las manos durante el viaje. Si lo hace, aplique gel antibacterial inmediatamente.
- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, gel antibacterial, o alcohol antiséptico al 70% durante mínimo 30 a 40 segundos. Equivalente a lo que dura la canción de cumpleaños.
- Evitar tocarse la cara o superficies descubiertas del cuerpo con las manos.
- Al llegar al sitio de atención, entregue su orden y evite tener contacto con las manos con otras personas, saludos de beso o contacto físico.
- Se les informa que estarán aislados durante la infusión del medicamento.
- Tenga los mismos cuidados al regresar a casa.
- Al llegar a casa lavarse las manos, lavar la ropa que trae puesta, nuevamente lavarse las manos y desinfectar los objetos personales; de ser posible, bañarse..

Para los pacientes que requieren terapia de reemplazo con inmunoglobulina subcutánea

- Continuar esquema de aplicación como venía haciéndolo en casa.

Para mayor información sobre infección por Coronavirus (COVID19), revise el comunicado adjunto y en caso de necesitarlo, comuníquese con el personal del Grupo de Inmunodeficiencias Primarias en la Sede de Investigación Universitaria (SIU), solamente empleando el siguiente correo electrónico: asistencia.grupoidp@udea.edu.co



Julio Cesar Orrego, MD, MS

Médico Inmunólogo

Coordinador área clínica, Grupo de Inmunodeficiencias Primarias (IDPs)

Profesor departamento de Pediatría y Puericultura

Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia

José Luis Franco, MD, MSc, DSc

Coordinador, Grupo de Inmunodeficiencias Primarias (IDPs)

Director, Centro Jeffrey Modell para Diagnóstico e Investigación en IDPs

Sede de Investigación Universitaria -SIU-

Departamento de Microbiología y Parasitología

Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia